

Признаки, характеризующие возможную наркозависимость, разделены на поведенческие и физиологические.

**Тактика работы (алгоритм) по выявлению наркозависимых в подростковой среде.**

<b>Поведенческие признаки, характеризующие возможную наркозависимость</b>	<b>Степень риска потребления</b>
1) Резкое снижение успеваемости и интереса к учебе, участвовавшие прогулы занятий.	<u>Легкая степень</u> (может быть обусловлена особенностями “переходного возраста”)
2) Высказывание ребенка о бессмысленности и тяжести жизни, появившийся интерес к разговорам о наркотиках, отстаивание идеи о легализации наркотиков. Появление в лексиконе жаргонных слов.	<u>Средняя степень</u>
3) Изменения поведения проявляются в нарастающей хитрости, изворотливости. Отмечается потеря энтузиазма, безразличие к делам, повышенная апатия может сменяться необъяснимой активностью. Потеря интереса к противоположному полу. Настроение может меняться по непонятным причинам, очень часто не соответствует реальной ситуации, например: добродушность в скандале.	<u>Выше среднего.</u>  Факт употребления наркотиков может быть очевиден (особенно при наличии выше-описанных признаков).
4) Увеличение финансовых запросов: пропажа из дома и в классе денег, книг, ценностей; противоправные действия или кражи вне дома; наличие больших денежных сумм у ребенка.	<u>Выше среднего</u>
5) Общие психические изменения: ухудшение внимания, памяти, способности к логическому мышлению. Резкое снижение работоспособности. Провалы в памяти. Быстрая утомляемость, сменяющаяся необъяснимой активностью.	<u>Высокая</u>

<p>б) Появление на теле всевозможных татуировок, рисунков (паутина, монстры, холодное оружие, черепа); посторонние запахи (уксусная кислота, ацетон, клей «Момент», жидкость для пропитки кожи) от волос и одежды; частые синяки, ожоги от сигарет, порезы; следы инъекций, находки шприцов, игл, пустых ампул, закопченной посуды, таблеток, травы.</p>	<p><u>Выраженная</u></p>
<p><b>Физиологические признаки, характеризующие возможную наркозависимость</b></p>	
<p>1. Хронический кашель, частый насморк, бледность или покраснение кожи.</p>	<p><u>Степень</u> определяется в зависимости от поставленного диагноза</p>
<p>2. Потеря аппетита, похудание, иногда чрезмерное употребление пищи («зверский» аппетит – при употреблении конопли), расстройства желудочно-кишечного тракта</p>	<p><u>Степень</u> определяется в зависимости от поставленного диагноза</p>
<p>3. Изменение реакции зрачка на свет (расширение или сужение глаза), например: опьянение наркотиками опийной группы, гашишем – зрачок необычно узкий; опьянение психостимуляторами – зрачок расширенный.</p>	<p><u>Высокая, выраженная</u></p>
<p>4. Плохая координация движений (пошатывание, спотыкание), но без характерного запаха алкоголя изо рта. Оживление, болтливость, сексуальное возбуждение, мелкое дрожание пальцев, смазанная невнятная речь, жестикуляция, повышенная потливость, резкие скачки артериального давления, нарушение чувства времени и пространства, нарушение восприятия действительности. Снижение болевой чувствительности.</p>	<p><u>Высокая, выраженная</u></p>
<p>5. Физическая и (или) психическая зависимость</p>	